


水害時の消毒方法一覧(緊急時対応消毒薬剤)

逆性せっけん 塩化ベンザルコニウムの原液(10%濃度)を水道水で希釈する調整方法



※誤って飲んでしまうと危険です！保存の際は目印をするなどの対策を！

消毒対象	消毒液	調整方法	使用方法
屋内 ●汚水に浸った壁面 ●床●家財道具	逆性せっけん液 ・ベンザルコニウム 塩化物液 ・オスバン ・ホエスミン ・クレミール	上記の通り	泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭き後、薄めた液を浸した布などでよく拭く。
屋外 ●汚物があふれた場所 ●動物の死骸や腐敗物が漂着した場所 ●氾濫した汚水が付着した壁面		●通常汚染の場合 上記の通り ●し尿等で汚染度が高い場合は、水 1ℓ に塩化ベンザルコニウム 20 ml で調整。	家屋の周りは、じょうろや噴霧器等で濡れるように撒く。 壁面は泥などの汚れを水で落としてから、消毒液を浸した布などでよく拭く。
手指		上記の通り	汚れを石けん等で洗った後、流水で石けんを落とし、洗面器等に薄めた消毒液に手首まで浸し、30 秒以上もみ洗いし、乾いたタオルでよく拭く。
食器類	次亜塩素酸ナトリウム または、ハイターなどの塩素系漂白剤	5%次亜塩素酸ナトリウム 4mlに水を加えて1ℓとする。 ハイターの場合、キャップ半量 (3ml) に水を加えて1ℓにする。	食器を水洗いした後、消毒液に 10 分以上浸し、水洗いして自然乾燥させる。 ※金属には使用しない

注意事項

- 作業時は長袖・長ズボンを着用し、メガネ・マスク・ゴム手袋などを使用し、消毒液の付着を防ぐ。
- 皮膚に薬剤の原液が付いた場合、大量の石鹸と水でよく洗い流す。目に入った場合、水で 15 分以上洗い流し、医師の診察を受ける。
- 他の消毒液や洗剤と混ざらないこと。(有毒ガス発生の恐れあり)
- 薬液は使用直前に薄め、濃度を守る。作った消毒液は使い切ること！
- 浄化水槽内には散布しないこと